

Thornhill Endoscopy Centre
 390 Steeles Avenue West, Units 11&12
 Thornhill, ON L4J 6X2
 Tel: 905-88-COLON (26566)
 (Studio del medico)

La sua procedura è programmata per il giorno:

DATA: _____ ORA: _____ am/pm

LUOGO: _____



Registrarsi presso l'ospedale/clinica entro ____ am/pm

PICO-SALAX® Istruzioni per il Paziente

Prima della procedura è necessario assumere un potente lassativo. Il medico le ha consigliato di usare PICO-SALAX, un prodotto acquistabile in farmacia senza ricetta.

Dopo avere preso questo medicinale, è importante disporre di un gabinetto, poiché il suo effetto può iniziare entro 1 - 3 ore.



IL GIORNO PRIMA DELLA PROCEDURA: Seguire queste istruzioni (e non il foglio illustrativo).

Prendere la **1^a** Bustina di PICO-SALAX

DATA: DAY BEFORE TEST, ALLE 5pm am/pm,

Prendere la **2^a** Bustina di PICO-SALAX

DATA: DAY BEFORE TEST, ALLE 9pm am/pm.

COME PRENDERE PICO-SALAX:

1. Riempire una tazza con **150 ml (5 oz) di acqua fredda.**
2. Versare il contenuto della bustina nella **TAZZA** (la miscela può sprigionare calore – lasciare raffreddare prima di bere)
3. **Mescolare** per 2 – 3 minuti, fino a quando non sia completamente disciolto.




4. E' NECESSARIO BERE 1 ½ - 2 LITRI D'ACQUA O ALTRI LIQUIDI CHIARI NELLE 4 ORE SUCCESSIVE ALL'ASSUNZIONE DEL CONTENUTO DI OGNI BUSTINA.



BERE SOLTANTO LIQUIDI CHIARI - Acqua, bibite energetiche chiare, succo di mela, succo di mirtillo americano bianco (non rosso), succo d'uva bianco (non viola), ginger ale, brodo, tè o caffè (zuccherato a piacere). Non bere liquidi che non siano trasparenti.

È possibile bere una piccola quantità di acqua per alleviare la sete fino a 4 ore prima della procedura.



Informi il suo medico se sta prendendo:

1. Aspirina® (ASA), o altri medicinali contenenti acido acetilsalicilico _____
2. Anticoagulanti come il Coumadin® (warfarin) _____
3. Pillole di ferro o complessi multivitaminici contenenti ferro _____
4. Ticlid® (ticlopidina), o Plavix® (clopidogrel) _____
5. Medicinali per il diabete _____
6. Pillole abitualmente assunte _____

ISTRUZIONI PARTICOLARI:
CLEAR FLUIDS ONLY FOR 24 HOURS BEFORE TEST
NO SEEDS, NUTS, OR CORN FOR 3 DAYS BEFORE TEST
TAKE 2 TABLETS OF DULCOLAX BEFORE 9AM (day before test)



Toronto, Ontario M2J 5C1
 ☎ 1-866-384-1314

® PICO-SALAX è un marchio commerciale registrato della Ferring B.V.
 ® Aspirina è un marchio commerciale registrato della Bayer AG
 ® Coumadin è un marchio commerciale registrato della Bristol-Myers Squibb
 ® Ticlid e ® Plavix sono marchi commerciali registrati della Sanofi-Aventis

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.pico-salax.ca